


# Instrucciones para el cuidado en su hogar



## Siga estas instrucciones para el cuidado en su hogar después del tratamiento con ATRIDOX®

- No cepille ni pase hilo dental por la zona tratada durante siete días.
- Su dentista puede prescribirle o recomendarle un enjuague bucal para utilizar durante los siete días posteriores a la aplicación de ATRIDOX, periodo en el cual usted no puede cepillarse los dientes o pasar el hilo dental.
- No se alarme si observa que pequeñas cantidades de ATRIDOX se desprenden. ATRIDOX no es nocivo a la salud en caso de ingestión.
- A medida que las encías se curan y la inflamación empieza a ceder, es posible que observe una pequeña retracción, y tal vez note que hay algo de “material blanco” en la línea gingival. Es el ATRIDOX que ha aplicado su dentista, y la mayor parte del mismo se disolverá, y será absorbido en el término de 28 días.

### ¿Qué es ATRIDOX?

ATRIDOX es un antibiótico en gel que se coloca suavemente en las bolsas de la encía donde proliferan las bacterias. Este producto solidifica rápidamente en la forma de una cera, liberando lentamente el antibiótico a la zona infectada por 21 días.<sup>1</sup>

### ¿Cómo actúa ATRIDOX?

ATRIDOX contiene un antibiótico llamado hclato de doxiciclina. Este antibiótico se libera lentamente alrededor de la bolsa del diente infectado por 21 días.<sup>1</sup> Este antibiótico actúa matando las bacterias asociadas con la enfermedad periodontal. En los estudios realizados, ATRIDOX ha demostrado mejorar la salud de sus encías, y ayudar a detener el avance de la gingivitis.



### ¿Tiene ATRIDOX efectos secundarios?\*

Los efectos secundarios de ATRIDOX son similares a los que se ven con un placebo. Es posible que se presenten dolores de cabeza, resfriados, molestias, dolor o dolencias en las encías, pérdida de fijación, aumento de la profundidad de la cavidad, dolor de muelas, sensibilidad a la presión, absceso, secreción, infección, drenaje, movilidad extrema, supuración periodontal, sensibilidad dental al frío y al calor. Comuníquese con su dentista si siente una molestia que no sea habitual.

### ¿Qué puedo hacer para prevenir la recurrencia de una gingivitis?

Después de siete días, cepílese los dientes y pase el hilo dental, siguiendo las recomendaciones de su dentista. También es importante seguir el horario de mantenimiento periódico que su dentista han prescrito.

NOMBRE DEL PACIENTE \_\_\_\_\_

DÍA DEL TRATAMIENTO \_\_\_\_\_ PRÓXIMA CONSULTA \_\_\_\_\_

\*Reporte efectos secundarios adversos de medicamentos con receta al FDA Visite [fda.gov/medwatch](http://fda.gov/medwatch), o llame al 1-800-FDA-1088.  
References: 1. Stoller N, Johnson L, Trapnell S, et al. The pharmacokinetic profile of a biodegradable controlled release delivery system containing doxycycline compared to systemically delivered doxycycline in gingival crevicular fluid, saliva and serum. J Periodontol. 1998;69:1085-1091.

ATRIDOX® is a registered trademark of TOLMAR Inc. © 2008 TOLMAR Inc. ATP0808020

 **ATRIDOX**  
(doxycycline hyclate) 10%  
[www.atridox.com](http://www.atridox.com)